

Evaluatieformulier





Praktijk Reanimatie



Jurylid:	Datum:
Cursist 1:	Score:
Cursist 2:	Score:

1^{STE} DEEL: VOLWASSENE OP HET DROGE ALLEEN – BLS (1' REANIMATIE)

Controlefiche	Cursist 1	Controlefiche	Cursist 2
Controle veiligheid	☐	Controle veiligheid	☐
Controle bewustzijn	☐	Controle bewustzijn	☐
Bel 1-1-2 en haal een pocketmasker HMEF	☐	Bel 1-1-2 en haal een pocketmasker HMEF	☐
Controle ademhaling	☐	Controle ademhaling	☐
Geef 30 borstcompressies	☐	Geef 30 borstcompressies	☐
Geef 2 beademingen met een pocketmasker HMEF	☐	Geef 2 beademingen met de pocketmasker HMEF	☐
Ga door met CPR 30:2	☐	Ga door met CPR 30:2	☐
Tempo	☐	Tempo	☐
Diepte	☐	Diepte	☐

Compressies  Beademing   Minstens 80% voor de BLS van 1 minuut	Compressies  Beademing   Minstens 80% voor de BLS van 1 minuut
--	---

2^{DE} DEEL: ALS VOLWASSENE MET BLAASBALLON OF MTV EN AED MET TWEE REDDERS

Drenkeling / Geen drenkeling

Volwassene / baby / kind

AED + blaasballon / AED + MTV

Controlefiche	Cursist 1	Cursist 2
Veiligheid	☐	
Controle bewustzijn	☐	
Laat cursist 2 de 1-1-2 bellen	☐	
Cursist 2 belt 1-1-2		☐
Controle ademhaling	☐	
Cursist 1 geeft 5 startbeademingen met pocketmasker HMEF	☐	
Cursist 1 gaat door met CPR 30:2 of 15:2 (kind/baby)	☐	
Cursist 2 legt de O2 neer boven het hoofd van het slachtoffer, zet de AED aan en volgt de instructies		☐
Cursist 2 meldt O2 afwenden, patiënt niet aanraken alvorens hij de schok toedient		☐
Cursist 2 geeft de schok met de AED		☐
Cursist 1 maakt de O2 klaar voor gebruik. Eenmaal klaar meldt hij dit aan cursist 2	☐	
Cursist 2 voert borstcompressies en beademingen uit (2 minuten)		☐
Bij 2de analyse geeft cursist 2 aan dat er gewisseld moet worden		☐
Cursist 1 meldt O2 afwenden, patiënt niet aanraken alvorens hij de schok toedient	☐	
Cursist 1 voert borstcompressies en beademingen uit gedurende maximum 2 minuut	☐	
Inhalatie O2 door cursist 2		☐
Bemerkingen:		
Eindscore examen 1 en 2 samen:		
Cursist 1:	Cursist 2:	

Opgelet:

AA=A AB/BA/BB= B AC/BC/CC= C AD/BD/CD/DD= D

BIJLAGE: LIJST MET GROTE EN KLEINE FOUTEN REANIMATIE

1 grote fout of 4 kleine fouten = niet geslaagd.

Grote fouten staan in het **vet met beige achtergrond**.

V/X	Foutieve handelingen
	Veiligheid verzekeren
	Over het slachtoffer stappen
	Controle bewustzijn
	Heel hard schudden (hoofd duidelijk van de grond)
	Hulpdiensten verwittigen
	1-1-2 laten verwittigen/zelf verwittigen: onvolledige info meegeven (vergeten te vermelden dat het slachtoffer geen ademhaling heeft en/of de locatie niet doorgegeven).
	Nalaten te vragen aan collega redder om de O2 en AED te halen
	Controle ademhaling
	Hoofd niet achterwaarts kantelen
	Hoofd heel weinig achterwaarts kantelen (bij volw zonder vermoeden van nekletsel)
	Het hoofd eerder bruusk én maximaal achterwaarts kantelen (bij geen vermoeden van nekletsel)
	Geen kin liften
	< 5 seconden controle bewustzijn en ademhaling = sterk afwijkend < 4 seconden
	> 10 seconden controle bewustzijn en ademhaling = sterk afwijkend > 12 seconden
	Borstcompressies
	Compressies systematisch én duidelijk < 100/min = sterk afwijkend < 80/min
	Compressies systematisch en duidelijk > 120 /min = sterk afwijkend > 140/min
	Handenplaatsing nooit in het midden van borstkas van volwassene (duidelijk op ribben of op zwaardvormig uitsteeksel), nooit op onderste helft van borstbeen (kind/baby)
	Handenplaatsing soms onnauwkeurig
	De borstkas systematisch onvolledig ontspannen
	Tijdens de borstcompressies meermaals contact lossen met de borstkas
	De borstkas systematisch én duidelijk < 5 cm indrukken (volwassene), < 1/3 (kind/baby)
	De borstkas systematisch en duidelijk > 6 cm indrukken (volwassene), > 5 cm (kind/baby)
	Beademing (met blaasballon of MTV - HMEF)
	Het hoofd eerder bruusk én maximaal achterwaarts kantelen
	De borstkas gaat niet omhoog (minstens 5 keer tijdens het examen reanimatie van eenzelfde cursist)
	Deze grote fout wordt gegeven aan diegene het masker fixeert, op voorwaarde dat de andere redder meldt "de borstkas gaat niet omhoog" Indien de redder die de zuurstof toedient dit niet meldt krijgt ook hij een grote fout
	Het niet gebruiken van de kapbeademing met twee handen bij de beademingen met zuurstof
	De borstkas rijst heel veel (maximaal)
	De mond tussen 2 beademingen niet of amper van de mond van het slachtoffer nemen (rebreathing)

	Indien alleen: de borstcompressies > 10 seconden onderbreken om de 2 beademingen te geven Indien met twee: de borstcompressies > 5 seconden onderbreken om de 2 beademingen te geven
	Verhouding borstcompressies: beademing met blaasballon/HMEF of MTV/HMEF - volwassene: andere (sterk afwijkende) verhouding dan 30:2 (meer dan 2 verschil, bijvoorbeeld: 27:2) - kind en baby: andere (sterk afwijkende) verhouding dan 15:2 (bijvoorbeeld: 18:2)
	Gebruik AED
	Cursist meldt niet aan collega "zuurstof afwenden"
	Het niet kleven van pediatrie pads bij een baby
	De redder kleeft de elektroden duidelijk fout (bijvoorbeeld linkerschouder en rechterkant van de borstkas)
	Beide redders hebben tijdens hun REA geen shock toegediend
	De redder duwt de aan/uit knop in i.p.v. de shockknop. De collega mag de redder hier attent op maken
	AED niet onmiddellijk activeren
	Elektroden onnauwkeurig kleven = niet kleven zoals afgebeeld op de elektroden
	Na de stroomstoot niet onmiddellijk starten met borstcompressies
	De redder wisselt de pads van de voorziene plaats (rechterschouder en linkerkant van de borstkas).
	De redder duwt onvoldoende hard op de shockknop, waardoor het flikkerlicht van de AED blijft pinken en er nog geen shock werd gegeven. De andere redder helpt zijn collega door deze hierop attent te maken.
V/X	Verkeerde volgorde handelingen
	1-1-2 pas verwittigen tijdens de borstcompressies
	1-1-2 verwittigen na de controle ademhaling
	2 beademingen geven voor de borstcompressies
	Bij een volwassene op het droge (zonder collega): niet onmiddellijk zelf de 1-1-2 verwittigen
	De 2de redder haalt de AED en het zuurstoftoedieningssysteem en draait bij het neerleggen van het zuurstoftoedieningssysteem de fles al open, terwijl dit eigenlijk door de andere redder later dient te gebeuren
	Redder aan AED: niet na ruim 2 min wisselen van functie (met collega-redder aan O2-voorziening)
V/X	Handelingen vergeten
	Niet aangeven oog te hebben voor mogelijk gevaar
	Geen controle bewustzijn en/of geen controle ademhaling
	1-1-2 niet verwittigen
	Geen 5 startbeademingen geven (bij drenkeling, kind/baby)
	AED: geen controle (visueel en verbaal) afstand van AED + SO en afwenden O2 tijdens analyse AED: geen controle (visueel en verbaal) afstand van AED + SO en afwenden O2 tijdens shock
V/X	O²-toediening
	Niet binnen 2 minuten (=vóór de 2^e analyse) O2 toedienen
	Bij ontwaken: Ademhaling niet controleren + niet spontaan O2 inhalatie geven
	Andere fouten mogen door de docenten aangerekend worden!